

A ***kacsacsőrű emlős*** feje elülső részén egy sajátságos rugalmas szaruképződményt visel. Ez a kacsa csőrére emlékeztet.
A kacsacsőrű emlős tökéletesen alkalmazkodott a vízi életmódhoz. A hód farkához hasonló lapos, szőrös farka van. Tompa karomban végződő ujjai közt a karmok elé nyúló úszóhártya feszül. Mikor a víz alatt tartózkodik, a fülnyílását és a szemét hártyaszerű bőrredő takarja el. Remekül mozog a vízben, sebesen úszik, ha kell villámgyorsan alábukik. Akár 10 percig képes a víz alatt maradni. Rovarlárvákkal, különféle kagylókkal és csigákkal táplálkozik, melyeket csőrével szűr ki az iszapból.
A folyó partjában a vízbenyúló lakókamráját úgy alakítja ki, hogy sose öntse el a víz.

A nőstény előre elkészített, levelekkel bélelt költővackába általában 2 tojást rak, melyekből 4 hét múlva kelnek ki a kicsinyei. Kezdetben anyjuk tejével táplálkoznak. Anyjuk szőrzetéről nyalogatják le 2 mirigymezőjének tejszerű váladékát, mivel a kacsacsőrű nőstényeknek nincs csecsbimbójuk.
A kicsik 6 hét múlva már képesek önállóan gondoskodni táplálékukról.
A kacsacsőrű emlősök Ausztráliában élnek. <u>Védett álltok.</u>

1. A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!
Melyik földrészen él a kacsacsőrű emlős? _____
Milyen életmódhoz alkalmazkodott? _____
Mivel táplálkozik a kacsacsőrű emlős? _____
_____

2.Az igaz állításokat húzd alá!
A kacsacsőrű emlős, mint minden emlős elevenszülő.
A kacsacsőrű emlős tojásokkal szaporodik.
A nőstényeknek van csecsbimbójuk és így szoptatnak.
A nőstényeknek nincs csecsbimbójuk.

3.Húzd alá a szövegben azokat a mondatokat, amelyekből kiderül, hogy hogyan alkalmazkodott a kacsacsőrű emlős a víz alatti életmódhoz!